

به نام خدا

داروهای مصرفی بیماران دیالیز

فولیک اسید و فروسولفات :

در بیماران کم خون جهت تایید گلبول قرمز و خون سازی مصرف می شود .
عوارض: راش، قرمزی، خارش، ضعف عضلانی

کلسیترول (روکاترول)

در درمان سطح پایین کلسیم خون و باعث کاهش سطح بالای هورمون پاراتیروئید می شود .طبق دستور و برای تاثیر بهتر بعد دیالیز مصرف می شود.
عوارض: خواب آلودگی، سردرد، ضعف، تاری دید، تهوع، یبوست

رناژل

به صورت قرص ۵۰۰ میلی گرمی، در درمان فسفر بالا و سبب کاهش فسفر می شود دارو را همراه با غذا یا بلافاصله بعد از غذا مصرف کنید ، فاصله با داروهای ضد تشنج، وارفارین و سیپروفلوکساسین باید حداقل یک تا دو ساعت باشد.

کلسیم کربنات ۵۰۰

به صورت قرص ۵۰۰ میلی گرمی ،در روده با فسفر غذا ترکیب شده واز جذب و ورود به خون جلوگیری می کند.
نحوه ی مصرف: اگر هدف اصلاح کلسیم باشد باید دارو را یک ساعت بعد از غذا و با یک لیوان پر از آب میل کنید. اگر هدف اصلاح فسفر است دارو باید وسط غذا میل شود.
عوارض: بی اشتها، تکرار ادرار، خشکی دهان، گیجی ،هذیان ،که نشانه ی افزایش بیش از حد کلسیم در بدن است باید سریعاً به پزشک اطلاع داده شود.

سینا کلس

داروی اختصاصی درمان PTH (هورمون پاراتیروئید)، این دارو در صورت کلسیم خون بالاتر از ۴/۸ تجویز می شود. چون باعث کاهش کلسیم می شود در سطح پایین کلسیم تجویز نمی شود.
عوارض: تهوع عارضه شایع است.

نفرویت

مکمل غذایی شامل ویتامین های B_۱ ، B_۲ ، B_{۱۲} بیوتین وروی است. به دلیل محدودیت در رژیم غذایی و بی اشتها، مصرف این دارو توصیه می شود و باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی و عصبی بدن می شود.

آمپول ونوفر:

از ترکیبات آهن وضد کم خونی می باشد، به شکل آمپول های ۵ میلی لیتری که حاوی ۱۰۰ میلی گرم محلول قهوه ای تیره آهن عرضه می شود.

عوارض: افت فشار خون، تغییر حس چشایی، تهوع و احساس طعم فلز در دهان، نیاز به نگهداری در یخچال ندارد، با هیچ دارویی نباید مخلوط شود، در زمان مصرف قرص آهن قطع می شود.

آمپول ۱۲B و BComplex

باعث افزایش انرژی می گردد و در درمان کم خونی مفید است.

آمپول اپرکس

جهت درمان و اصلاح کم خونی به شکل مایع بی رنگ به صورت آمپول های ۱۰۰۰۰، ۴۰۰۰، ۲۰۰۰ عرضه می شود. تزریق به صورت زیر جلدی با استفاده از سرنگ انسولین، محل تزریق بازوها، دیواره قدامی شکم و دور ناف، که باید به طور مداوم تغییر کند. از یخ زدگی جلوگیری شود، قبل از تزریق فشار خون باید

کنترل شود. بالای ۱۶۰ میلی گرم جیوه در منزل تزریق

عوارض: در صورت مصرف بالای آن غلظت خون افزایش می یابد و باعث از کار افتادن فیستول و افزایش فشار خون می شود.

آمپول هپارین

در پیشگیری و درمان ترومپوزورهای عمقی و ترومبوآمبولی ریوی جلوگیری از انعقاد در گردش خون بدن طی جراحی قلب و روش های دیالیز به عنوان داروی کمکی در درمان آمبول شریانی محیطی می شود. در دیالیز جهت جلوگیری از لخته شدن خون در صافی دیالیز در زمان دیالیز استفاده می شود.

تهیه کننده: زهرا ثامری سرپرستار بخش دیالیز

منبع کتاب: پرستار دیالیز

تایید کننده: دکتر داریوش مکرمان متخصص داخلی

تاریخ تهیه: بهار ۱۳۹۸

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۵