

میشود. مخزن پورت توسط لوله باریکی با ضخامت مشابه مغزی خودکار به یکی از سیاهرگهای اصلی بدن ارتباط پیدا میکند. سوزن تزریق از راه پوست به مخزن وارد میشود و داروهای شیمی درمانی، آنتی بیوتیکها، سرم، در صورت نیاز برای گرفتن نمونه خون آزمایشات، خون و فرآورده های آن و یا داروهای حاجب وریدی برای تهیه عکس رنگی و... از طریق لوله ارتباطی به سیاهرگهای مرکزی بدن وارد میشود.

چه راه حل مناسبی برای شیمی درمانی وجود دارد؟

در مواردیکه لازم است شیمی درمانی در جلسات متعدد انجام شود استفاده از پورت باعث میشود که داروهای شیمی درمانی از این طریق وبدون آسیب به وریدهای محیطی وارد بدن گردند.

آیا برای گذاشتن پورت نیاز به بیهوشی می باشد؟

خیر، این کار با بی حسی موضعی براحتی انجام پذیر است. مگر در شرایط خاص که بستگی به وضعیت جسمانی بیمار دارد.

آیا بعد از پورت گذاری نیاز به بستری می باشد؟

خیر، این کار بصورت سرپایی انجام می شود و یک ساعت بعد از پورت گذاری می توانید به فعالیتهای روزمره خود باز گردید.


پورت گذاری به چه صورت انجام می شود؟

پس از بی حسی موضعی با هدایت سونوگرافی داپلر، کاتتر در داخل رگ مرکزی قرار داده می شود. سپس براساس اندازه پورت برشی بر روی پوست ایجاد می شود که معمولا در ناحیه قفسه سینه می باشد و محفظه پورت زیر پوست کاشته شده و پوست توسط نخ قابل جذب به روش پلاستیک دوخته می شود.

چگونه از پورت استفاده می شود؟

در صورت نیاز بلافاصله بعد از پورت گذاری می توان از آن استفاده نمود. هنگامیکه جهت تزریق داروی شیمی درمانی یا گرفتن نمونه خون از پورت استفاده شود پوست روی محل پورت باید بخوبی استریل گردیده و سپس سوزن مخصوص از طریق پوست وارد محفظه می گردد. لازم به ذکر است که این عمل دردناک نمی باشد.

چه مراقبت هایی بعد از پورت گذاری لازم است؟



پورت چیست و کاربرد آن چیست؟

پورت وسیله ای است غالبا از جنس سلیکون که دارای یک مخزن و یک لوله ارتباطی میباشد. مخزن از نظر اندازه مشابه صفحه ساعت مچی است و در زیر پوست و در قسمت بالای قفسه سینه در سمت راست یا چپ قرار داده



مراقبت از پورت

تهیه کننده: پرستار مینا ناظری

منبع: کتاب پرونرسودارت

پزشکان تایید کننده: دکتر احمد نصیری و دکتر فایز

فرزام نیا

تاریخ تهیه: خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ بازنگری: تیر ماه ۱۴۰۵

بیمار گرامی:

از اعتماد و حسن نظر جنابعالی نسبت به انتخاب این مجتمع

کمال تشکر را داریم.

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطلاعات ضروری در خصوص
بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن میباشد



درمان خاص خودشان را دارند. در مشاهده موارد
زیر باید فوراً با پزشک خود تماس بگیرید:

دیدن ناحیه قرمز متورم یا دردناک اطراف پورت
و داشتن علائمی مانند تب، تنگی نفس، لرز و
سرگیجه در این موارد به شما آنتی بیوتیک داده
خواهد شد. علائم لخته شدن خون در داخل پورت
تورم گردن و قرمزی پوست می باشد. در صورت
لخته شدن خون در داخل پورت و یا عفونت شدید
ممکن است نیاز به خروج پورت باشد.

**آیا وجود پورت در تصویربرداری اختلال ایجاد
می کند؟**

خیر، شما با وجود پورت می توانید سی تی اسکن
و یا ام آر آی براحتی انجام دهید.

پانسمان محل پورت تا زمانی که پزشک معالج گفته
است روزانه تعویض گردد. در هفته اول ممکن است
درد خفیف و کبودی را در محل شکاف تجربه کنید
جهت رفع این درد مصرف مسکن ساده مانند
استامینوفن با مشورت پزشک معالج به شما کمک
خواهد کرد. بعد از پورت گذاری ممکن است آنتی
بیوتیک خوراکی برای شما تجویز شود که برای
پیشگیری از عفونت می باشد.

در صورت باقی ماندن قرمزی و تورم اطراف محل
پورت حتماً بعد از یک هفته به کلینیک مراجعه
نمایید.

بعد از تزریق پورت مقداری داروی ضد انعقاد خون
(هپارین) به داخل پورت تزریق می گردد تا از لخته
شدن خون داخل پورت جلوگیری شود. اگر بطور منظم
از پورت استفاده نشود لازم است ماهیانه داخل پورت
شستشو داده شود.

مشکلات و عوارض احتمالی

عوارضی مانند عفونت یا ایجاد لخته در سیاهرگ
مورد نظر یا لوله پورت و یا جدا شدن مخزن از
مجرای پورت ممکن است ایجاد گردد که هر کدام